

## Aufruf zur verstärkten Beachtung der in Deutschland vorkommenden Unterarten von *Epilobium ciliatum* RAFIN.

In der 10. Auflage des Rothmalers (JÄGER u. WERNER 2005: 478) werden beim Drüsigen Weidenröschen (*Epilobium ciliatum* RAFIN.) erstmals 2 Unterarten (subsp. *ciliatum* und subsp. *glandulosum* (LEHM.) HOCH & RAVEN) verschlüsselt.

NIELSEN 1988 (vgl. BUTTLER 1989: Literaturberichte, Bot. Natursch. Hessen 3, S. 61 - <http://www.bvnh.de/bnh/download/bnh03/03-lit.exe>) unterscheidet ebenfalls diese beiden Unterarten; allerdings differenziert er im Gegensatz zum neuen Rothmaler die Unterart *ciliatum* weiter in „**Typ A**“ und „**Typ B**“.

Diese 3 Sippen werden in Skandinavien gegenwärtig als Arten behandelt (MOSSBERG & STENBERG 2003: Den nya nordiska Floran, S. 419); vgl. auch „Den virtuella Floran“:

- "*Epilobium ciliatum* RAFIN."

[= „**Typ A**“ **Weißes Drüsen-Weidenröschen**]

<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilcil.html>

- "*Epilobium adenocaulon* HAUSSKN."

[= „**Typ B**“ **Gewöhnliches Drüsen-Weidenröschen / Amerikanisches Weidenröschen**]

<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilade.html>

- "*Epilobium glandulosum* LEHM."

[= **Alaska-Weidenröschen**]

<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilgla.html>

In aktuellen Bestimmungsfloren werden üblicherweise keine „Typen“ unterhalb von Unterarten verschlüsselt; diese 3 Taxa werden jedoch in den USA – wo sie indigen sind – als Unterarten akzeptiert:

- Klassifikation der Art *Epilobium ciliatum* RAFIN.:

<http://www.plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=EPCI&display=63>

- Profil der Art *Epilobium ciliatum* RAFIN.:

<http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=EPCI>

- - Profil von *Epilobium ciliatum* RAFIN. subsp. *ciliatum*

[= „**Typ A**“ **Weißes Drüsen-Weidenröschen**]

<http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=EPCIC>

- - Profil von *Epilobium ciliatum* RAFIN. subsp. *glandulosum* (LEHM.) HOCH & RAVEN

[= **Alaska-Weidenröschen**]

<http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=EPCIG>

- - Profil von *Epilobium ciliatum* RAF. subsp. *watsonii* (BARBEY) HOCH & RAVEN

[= „**Typ B**“ **Gewöhnliches Drüsen-Weidenröschen / Amerikanisches Weidenröschen**]

<http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=EPCIW>

Die 3 Sippen sollten künftig gleichwertig auf Unterartniveau Beachtung finden; dazu kann die Übersetzung des Bestimmungsschlüssels von NIELSEN 1988 bei BUTTLER 1989 herangezogen werden:

- <http://www.bvnh.de/bnh/bestimm/gatte/epilobium.html>

Die Nomenklatur erscheint noch nicht gesichert:

So wird bei *Epilobium ciliatum* RAFIN. subsp. *ciliatum* im Internet in „Den virtuelle Floran“ *E. saximontanum* HAUSSKN. als Synonym genannt; diese Sippe wird in Amerika als gesonderte Art anerkannt: <http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=EPSA>

Bei *Epilobium adenocaulon* HAUSSKN. wird in „Den virtuelle Floran“ als Synonym *Epilobium watsonii* BARBEY (Basionym der entsprechenden Unterart) genannt, hingegen wird *Epilobium adenocaulon* HAUSSKN. s.str. in den USA als Synonym aufgefasst von *Epilobium ciliatum* RAFIN. subsp. *ciliatum* (siehe Link oben).

Ergänzende Hinweise/Korrekturen zur Taxonomie und Nomenklatur der *Epilobium ciliatum*-Sippen sowie Fundortmeldungen wären sicher von Interesse, da über die Verbreitung der drei Unterarten in Deutschland – die offensichtlich auch hier alle vorkommen - bisher nur wenig bekannt ist.

Kontaktadresse:

Eggert Horst ([eggerthorst@gmx.de](mailto:eggerthorst@gmx.de)), Hohenesch 22, 25560 Pöschendorf

20.07.2006