Rubus appropinquatus Plieninger
Angenäherte Haselblattbrombeere

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus appropinquatus* und *Rubus orthostachys*
(aus Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 10)

Merkmale	***R. appropinquatus***	***R. orthostachys***
Schösslingsquerschnitt	stumpfkantig bis rundlich	scharfkantig
Stacheln	gelblich, > 3 mm lang	rötlich, bis ca. 3 mm lang
Blatthaltung	kaum konvex, aber oft etwas gefaltet	deutlich konvex
Verlauf Blattrand unter Spitze	meist breit dreieckig	bogig abgerundet
Serratur	deutlich periodisch, mit stumpf dreieckigen Zähnen	fast gleichmäßig, mit ± rundlichen Zähnen
Behaarung Blattoberseite	mäßig dicht, striegelig	(fast) fehlend
Behaarung Blattunterseite	Haare kürzer, schlaff, häufig büschelig, selten auch sternförmig	Haare lang, einfach, abstehend
Blütenstiele (Verzweigung und Länge)	Verzweigungswinkel höchstens mäßig spitz, Länge fast durchweg < 20 mm	Verzweigungswinkel sehr spitz, Länge oft > 20 mm
Drüsen im Blütenstand	Drüsen fast fehlend	Drüsen zahlreich (sessile und subsessile)
Randbehaarung Kronblätter	kahl oder fast kahl	dicht bewimpert
Farbe Kronblätter	weiß bis blassrosa	lebhaft rosa

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus appropinquatus* und *Rubus lamprocaulos*
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 10)

Merkmale	***R. appropinquatus***	***R. lamprocaulos***
Schössling	ohne Drüsen	drüsig
Serratur	deutlich periodisch, tief gesägt	gleichmäßig, kerbzähnig
Blattfarbe	matt mittelgrün	lebhaft dunkelgrün
Blütenstand	ohne Drüsen	drüsig

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus appropinquatus* und *Rubus histrionicus*
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 15)

Merkmale	***R. appropinquatus***	***R. histrionicus***
Blattfarbe	matt grün	leuchtend gelbgrün
Blattunterseite	nur schwach sternhaarig	weißfilzig
Blattspitze	10-15 mm lang	5-10 mm lang
Schössling	5-9(-12) pro 5 cm zunächst mit wenigen Haaren, bald verkahlend	7-12(-15) pro 5 cm zunächst mit bis zu 10 Haaren pro cm Seite, später meist verkahlend

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus appropinquatus* und *Rubus incisior*
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 10)

Merkmale	***R. appropinquatus***	***R. incisior***
Schössling	bald verkahlend	büschelhaarig
Blütenstand	(fast) ohne Drüsen	drüsenreich

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus appropinquatus* und *Rubus sanctae-hildegardis*
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 10)

Merkmale	***R. appropinquatus***	***R. sanctae-hildegardis***
Endblättchen	breit eiförmig bis verkehrt eiförmig	gerundet 5-eckig
Serratur	deutlich periodisch, tief gesägt	gleichmäßiger
Blütenstand	bis ca. 5 cm unter der Spitze unbeblättert	höher durchblättert