(nach M. Hassler in: Flora Germanica, Bd. 3, 2024, S. 151 und 142)

Rubus geyeri G.H. Loos (nom. ined.)
Geyer-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- **Form**: kantig - **Behaarung**: sehr dicht und lang abstehend aschgrau behaart, filzig - **Stieldrüsen**: zahlreich - **Stacheln**: ungleich, die größeren zu 5-12 pro 5 cm, fast pfriemlich, geneigt, (fast) alle gerade, 6-7 mm lang
Blätter	- **Blättchenanzahl**: 5-zählig - **Behaarung**: oberseits behaart, stärker verkahlend, etwas glänzend, unterseits grün, schimmernd samtig weich - **Endblättchen**: aus herzförmiger Basis schmal bis elliptisch, umgekehrt eiförmig bis eiförmig - **Serratur**: grob, mit bis 4 mm breiten Zähnen, Hauptzähnen z.T. auswärts gekrümmt - **Blattstiel**: Stacheln 10-18, etwas ungleich, gekrümmt bis ausgeprägt hakig, bis 4,5 mm lang
Blütenstand	- **Form**: breiter pyramidal, Äste länger (als bei *R. pannosus)* - **Blätter**: oft schon ca. 2 cm unterhalb der Spitze beginnend - **Achse**: dicht zottig-filzig und stieldrüsig, mit dünnen, etwas geneigten geraden Stacheln, daneben mit zerstreuten kleineren Stachelchen und (Drüsen-)Borsten - **Blütenstiele**: bis 2 cm lang, mit (0-)2-8 Stieldrüsen, Stacheln geneigt bis gekrümmt - **Kelch**: graufilzig-zottig, mit dunkelvioletten Stieldrüsen, (fast) unbestachelt, zurückgeschlagen - **Kronblätter**: reinweiß - **Staubblätter**: Antheren kahl - **Fruchtknoten**: dichtfilzig, Griffel grün

Ähnliche Taxa: *R. pannosus*

Verbreitung: In Nordrhein-Westfalen im Raum zwischen Menden, Brilon und Warstein an vielen Stellen vornehmlich an Waldwegrändern und Straßenböschungen; nach Süden bis Sündern.

Vergleich R. geyeri und R. pannosus

	R. geyeri	R. pannosus
Schössling	kantig	rundlich-stumpkantig
Blätter	stärker verkahlend, glänzend	mit 20-50 Haaren pro cm^2
- Endblättchen	schmal bis elliptisch, umgekehrt eiförmig bis schmal bis breit eiförmig	breit elliptisch bis schwach umgekehrt eiförmig
- Blattstiel	mit 10-18 etwas ungleichen, gekrümmten bis ausgeprägt hakigen, bis 4,5 mm langen Stacheln	mit 8-13 schlanken, stark geneigten, wenig gekrümmten 2,5-3,5 mm langen Stacheln
Blütenstand	- breiter, Äste länger - Blätter oft schon ca. 2 cm unterhalb der Spitze beginnend	- ziemlich schmal pyramidal - oben auf ca. 5-10 cm blattlos
- Blütenstiele	- bis 2 cm lang - mit (0-)2-8 Stieldrüsen - Stacheln gekrümmt bis ausgeprägt hakig, bis 4,5 mm lang	- 10-15 mm lang - mit dichten (>50), meist 0,3-0,6 mm langen Stieldrüsen - Stacheln gerade oder fast gerade, 1-2 mm lang
- Kronblätter	reinweiß	lebhaft rosarot
- Fruchtknoten	dichtfilzig; Griffel grün	meist kahl; Griffel rot