(nach M. Hassler in: Flora Germanica, Bd. 3, 2024, S. 345)

Rubus luticola A. Beek
Erdhügel-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- **Form:** rundlich, graulich blau bereift -**Behaarung:** kahl - **Stieldrüsen**: fast oder ganz drüsenlos - **Stacheln**: 20-50 pro 5 cm, dunkelbraun-violett, ungleich, nadelig, 3-4 mm lang
Blätter	- **Blättchenanzahl**: 3(-5)-zählig - **Behaarung**: oberseits kahl, unterseits fast kahl bis sanft behaart, mitunter etwas filzig - **Endblättchen**: breit 3-eckig herzförmig, meistens lappig, mitunter geteilt - **Serratur**: ziemlich gleichmäßig, scharf, nicht periodisch - **Blattstiel**: mit 2-9 nadelförmigen Stacheln
Blütenstand	- **Form**: kurz, stumpf - **Blätter**: hoch beblättert - **Achse**: angedrückt filzig, fast drüsenlos bis wenig drüsig; Stacheln 0-8 pro 5 cm, nadelförmig, 1-5 mm lang - **Blütenstiele**: filzig, mit 10->50 Stieldrüsen und 5-18 Stacheln - **Kelch**: graugrün, zurückgeschlagen bis aufrecht - **Kronblätter**: weiß - **Staubblätter**: Antheren kahl - **Fruchtknoten**: kahl

Ähnliche Taxa: Stark drüsige Formen von *R. dumetorum* (diese mit stark bereiften Früchten).

Ökologie und Soziologie: Wälder auf reicheren Böden; aber auch in Hecken

Verbreitung: sehr lokal im Nordwesten um Isselburg und Goch; Hauptverbreitung SO- und O-Niederlande und O-Belgien (Limburg, Flämisch-Brabant bis Hennegau).