(nach M. Hassler in: Flora Germanica, Bd. 3, 2024, S. 139)

Rubus taxandriae Vannerom ex A. Beek
Schwelende Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- **Behaarung**: dicht behaart - **Stieldrüsen**: 0-5 pro cm - **Stacheln**: 10-20 pro 5 cm, (oft stark) geneigt, gebogen oder gekniet, 5-8 mm lang, daneben einige kleinere Stachelchen
Blätter	- **Blättchenanzahl**: 3-5-zählig - **Behaarung**: oberseits kahl oder wenig behaart, unterseits mäßig bis dicht kurz behaart - **Endblättchen**: aus ausgebuchtetem Grund eiförmig bis elliptisch, mitunter etwas umgekehrt eiförmig oder fast kreisrund, kurz zugespitzt - **Serratur**: ziemlich regelmäßig, mit ziemlich breiten Zähnen - **Blattstiel**: mit 10->200 Stieldrüsen, Stacheln zu 8-12, stark geneigt, sichelig bis hakig
Blütenstand	- **Form**: ± pyramidal - **Achse**: mit 0-4 Stieldrüsen pro 5 cm; größere Stacheln zu 4-18 pro 5 cm, stark geneigt, gekrümmt, hakig oder oft gekniet, bis 4-7 mm lang - **Blütenstiele**: mit 4->50 langen Stieldrüsen und (4-)7-15 Stacheln - **Kelch**: locker zurückgeschlagen oder abstehend, später manchmal zum Teil aufgerichtet - **Kronblätter**: weiß oder blass rosa - **Staubblätter**: Antheren kahl - **Fruchtknoten**: behaart; Griffel an der Basis oder ganz (purpern-)rot

Verbreitung: Regionalsippe mit Hauptverbreitung in S-Niederlande, dort recht verbreitet; am Niederrhein sehr dicht an der Grenze und daher auf deutscher Seite am Niederrhein bei Kleve (etc.) zu erwarten.