Rubus vatavensis Žila & Trávn.
Otava-Brombeere

(Beschreibung sehr unvollständig)

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- **Form**: mittelgroß, bogig, stumpfkantig, an besonnten Orten intensiv braun-rot gefärbt - **Behaarung**: zerstreut bis mittelstark behaart - **Stieldrüsen**: zerstreut - **Stacheln**:
Blätter	- **Blättchenanzahl**: 4-5-zählig - **Behaarung**: unterseits nicht fühlbar behaart, fein und regelmäßig (1–2 mm tief) gezähnt - **Endblättchen**: länglich verkehrt-eiförmig bis breit verkehrt-eiförmig, abrupt in eine scharfe Spitze übergehend - **Serratur**: - **Seitenblättchen**: - **Blattstiel**:
Blütenstand	- **Form**: groß - **Blätter**: - **Achse**: - **Blütenstiele**: - **Kelch**: - **Kronblätter**: weiß bis leicht rosa - **Staubblätter**: - **Fruchtknoten**:

Ähnliche Taxa: *R.-bifrons*-Hybriden

Ökologie und Soziologie: thamnophil: Waldränder, Gebüsche an sonnigen Wuchsorten; kolline, wärmeliebende Art

Verbreitung: Regionalsippe mit Hauptverbreitung N-Österreich und Böhmen; in Deutschland bisher nur randlich in SO-Bayern im Donautal