Rubus wittigianus H.E. WEBER
Wittigs Brombeere

Fundorte: (aus H.E. Weber in: Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen Band 28, 2002, S. 153-157 f.)

Niedersachsen:

- 3814.22: Am Strubberg bei Wellendorf, nahe Nordrand der TK25 östlich der B68, 27.8.1980, Weber 80.827.1 (We).

Westfalen:

- 4014.23: Nordteil des Waldes Bredenheide, nahe Trig. Punkt 62 m in großen Beständen 12.9.2001, Weber 01.912.2 (We, vgl. auch die oben genannte Typus-Aufsammlung 2002).
- 4014.24: südlich Westmatteln beim Trig. Punkt 60 m, 12.9.2001, Weber.
- 4015.12 Beller westlich der Schule, 1.8.2002, Weber.
- 4015.23 Marienfeld, Wald südlich der Straße nach Brackwede, sehr zahlreich, 29.8.2001, Weber 01.829.2 (We).
- 4015.24 Remser Brook bei Marienfeld, nordöstlich Höhe 70 m, 29.8.2001 Weber.
- 4015.42: Oester bei Marienfeld, Waldrest südlich B513, 20.7.2002, Weber.
- 4115.21 Pumpwerk nordöstlich Herzebrock; 29.8.2001 Weber.
- 4117.14 nördlich Kaunitz nahe Höhe 96 m, 1.8.2001, Weber 01.801.2 (We).
- 4216.43 nördlich Rebbecke an Landstraße nahe der Nordost-Ecke des Rasterfeldes, 13.8.2001, Weber.
- 4218.22: Bad Lippspringe, 1977, Wittig E753 (We).

Fundorte der durch Stieldrüsen abweichenden Sippe:

Niedersachsen:

- 3816.222: Wege und Lichtungen im Kiefernforst nördlich Bennien, 27.7.1975, Weber 75.727.11, „Rubus benniensis“ (B, We).
- 3816.222: 27.7.1975, Weber75.727.12, „Rubus benniensis“ (B, We).
- 3816.222: 20.7.2002, Weber02.720.9 (We).
- 3816.223: Ibid., 27.7.1975, Weber 75.727.10, „Rubus benniensis“ (We).