

4. bayerisches Rubus-Konzil in Niederbayern (Isar-Inn-Hügelland,
Vorderer Bayerischer Wald, Lailinger Winkel, Passauer Abteiland
und Neuburger Wald)
vom 04. - 07.09.1995
in Neustift (Kloster der Benediktinerinnen), Gemeinde Ortenburg

Teilnehmer:

Prof. Dr. H. E. Weber Driverstr. 22 49377 Vechta
Otto Elsner Rottenstein 13 97491 Aidhausen
Friedrich Fűrnrrohr Laubholzweg 3 92345 Seubersdorf
Hansjörg Gaggermeier Köckstr. 10 94469 Deggendorf
Prof. Dr. Josef Holub Acad. of Sciences 25243 Pruhonice, Cz. Rep.
Ralf Jahn Universitätsstr. 31 93053 Regensburg
Barbara Köhler Koldestr. 8 91052 Erlangen
Dr. Günter Matzke-Hajek Driverstr. 22 49377 Vechta
Prof. Dr. Lenz Meierott Am Happach 43 97218 Gerbrunn
Martin Scheuerer Universitätsstr. 31 93053 Regensburg
Martin Schmid Am Europakanal 6 91056 Erlangen
Prof. Dr. Peter Schönfelder Universitätsstr. 31 93053 Regensburg
Wolfgang Subal Rüglandweg 6 90453 Nürnberg
Rainer Zange Bremer Str. 17 90765 Fürth

Exkursionsprotokoll (Nummer des Fundortes, MTB-Raster, Lokalität)

- 1) 04.09. - 7344/43 - Kufnerholz
Rubus caesius, R. epipsilos, R. idaeus, R. nessensis, R. bifrons,
R. bavaricus, R. bifrons-Hybride
- 2) 04.09. - 7344/43 - westl. Kufnerholz, Abzw. Meiering
R. epipsilos, R. bavaricus, R. idaeus, R. nessensis, R. montanus
- 3) 04.09. - 7344/43 - 300 m nördl. Punkt 2)
R. idaeus, R. bavaricus, R. epipsilos, R. nessensis, R.
constrictus
- 4) 05.09. - 7445/23 - Elexenbach
R. epipsilos, R. idaeus
- 5) 05.09. - 7445/23 - Elexenbach, Abzw. Kieswerk Kemating
R. epipsilos, R. idaeus, R. nessensis, R. indusiatus
- 6) 05.09. - 7445/23 - nordöstl. Ortenburg, Hierling, Abzw. Kronöd
R. epipsilos, R. nessensis, R. idaeus, R. rudis, R. bertramii, R.
indusiatus, R. sulcatus
- 7) 05.09. - 7545/11 - Staatsforst Steinkart
R. indusiatus, R. idaeus, R. epipsilos
- 8) 05.09. - 7545/13 - bei Forsting, Südlicher Steinkart
R. epipsilos, R. nessensis, R. indusiatus
- 9) 05.09. - 7545/42 - Unterschwärzenbach, Südrand zur Rott
R. idaeus

- 10) 05.09. - 7646/11 - südl. Pfaffing
R. pseudocaesius (pseudoidaeus nf. pseudocaesius), R. epipsilos,
Corylifolius spec., R. mollis, R. bertramii, R. oenensis, R.
indusiatus
- 11) 05.09. - 7743/41 - Forst Hart südl. Unterschwemm
R. epipsilos, R. idaeus, R. caesius
- 12) 05.09. - 7743/13 - Straße nördl. Julbach
R. epipsilos, R. montanus, R. cf. verae Holub ined.
- 13) 05.09. - 7742/41 - Parkplatz im Daxenthaler Forst
R. salisburgensis, R. epipsilos, R. caesius, R. gremlii, R.
amphistrophos
- 14) 05.09. - 7842/22 - südwestl. Mehring, Falzberg, Moräne
R. bertramii, R. epipsilos, R. idaeus
- 15) 05.09. - 7742/34 - Oettinger Forst nordwestl. Emmerting
R. idaeus, R. salisburgensis, R. bavaricus, R. pedemontanus, R.
oenensis, R. bertramii, R. amphistrophos, R. bifrons, R. epipsilos
- 16) 06.09. - 7146/41 - Zwischen Hohenaus und Straße 2132
R. idaeus, R. epipsilos, R. nessensis, R. rudis, R. hirtus agg.
- 17) 06.09. - 7147/33 - Buchbergmühle (Wolfsteiner Ohe)
R. bifrons, R. idaeus, R. mollis, R. epipsilos
- 18) 06.09. - 7347/13 - südl. Büchlberg, Straße
R. bertramii, R. epipsilos, R. idaeus, R. pedemontanus, R.
nessensis, R. plicatus, R. bavaricus, R. indusiatus, R.
franconicus
- 19) 06.09. - 7347/31 - Vocking
R. bertramii, R. epipsilos, R. plicatus, R. nessensis, R.
sulcatus, R. idaeus, R. rudis
- 20) 06.09. - 7447/12 - südwestl. Leithen, Donaurand
R. caesius, R. cf. parthenocissifolius Holub ined., R. Ser.
Radula, R. bifrons-Hybride, R. montanus, R. bifrons, R. nessensis
R. sulcatus
- 21) 06.09. - 7447/12 - Donaurand bei Leithen, SW-Exposition bei km
296
R. bavaricus, R. epipsilos
- 22) 06.09. - 7447/12 - Waldrand westl. Buchsee
R. bifrons, R. bertramii, R. idaeus, R. nessensis, R. plicatus, R.
sulcatus, R. montanus, R. hirtus agg., R. epipsilos
- 23) 06.09. - 7446/13 - Neuburger Wald westl. AS Passau/West
R. sulcatus, R. epipsilos, R. bertramii, R. bavaricus, R.
indusiatus, R. nessensis, R. radula, R. cf. amphistrophos
- 24) 06.09. - 7445/24 - Neuburger Wald nördl. Fürstenzell
R. bertramii, R. indusiatus, R. epipsilos, R. amphistrophos, R.
nessensis

25) 06.09. - 7345/44 - Donautal, Abzw. Rathmannsdorf, bei Klinghof
R. epipsilos, *R. idaeus*, *R. nessensis*, *R. amphistrophos*, *R. cf. percrispus* Holub ined., *R. rudis*

26) 06.09. - 7345/44 - km 18 Staatsstraße 2318
R. nessensis, *R. idaeus*, *R. rudis*, *R. epipsilos*, *R. sulcatus*

27) 07.09. - 7244/41 - Grube nordöstlich Hinterreckenberg
R. epipsilos, *R. montanus*, *R. nessensis*, *R. bifrons*, *R. bavaricus*,
R. cf. parthenocissifolius Holub ined., *R. sulcatus*, *R. apricus*,
R. elatior, *R. grabowskii*

Nachtrag

28) 04.09. - 7345/11 - zwischen Lengfelden und Knadlarn
R. epipsilos

29) 04.09. - 7545/11 - 0,8 km westl. Urlmanning
R. epipsilos, *R. nessensis*, *R. laciniatus*, *R. idaeus*, *R. sulcatus*,
R. caesius, *R. Glandulosus spec.*

Alphabetische Anordnung der Sippen mit MTB-Raster

<i>R. amphistrophos</i> FOCKE ?	7742/41	7742/34	7345/44	7445/24
<i>R. cf. amphistrophos</i>	7446/13			
<i>R. apricus</i> WIMMER	7244/41			
<i>R. bavaricus</i> W.C.R. WATSON	7244/41 7446/13	7344/43 7447/12	7347/13 7742/34	
<i>R. bertramii</i> G. BRAUN	7347/13 7447/13	7347/31 7646/11	7445/23 7742/34	7445/24 7842/22
<i>R. bifrons</i> VEST	7147/33 7742/34	7244/41	7344/43	7447/12
<i>R. bifrons-Hybride</i>	7344/43	7447/12		
<i>R. caesius</i> L.	7344/43 7743/41	7447/12	7545/11	7742/41
<i>R. constrictus</i> LEF. & P.J. MÜLL		7344/43		
<i>R. elatior</i> FOCKE	7244/41			
<i>R. epipsilos</i> FOCKE	7146/41 7345/44 7445/24 7446/13 7742/41	7147/33 7345/11 7445/23 7447/12 7743/41	7244/41 7347/13 7545/11 7646/11 7743/13	7344/43 7347/31 7545/13 7742/34 7842/22
<i>R. franconicus</i> H.E. WEBER	7347/13			
<i>R. grabowskii</i> WEIHE	7244/41			
<i>R. Ser. Glandulosi spec.</i>	7545/11			

<i>R. gremlii</i> FOCKE	7742/41			
<i>R. hirtus</i> agg. WALDST. & KIT.	7146/41	7447/12		
<i>R. idaeus</i> L.	7146/41	7147/33	7344/43	7345/44
	7347/13	7347/31	7445/23	7447/12
	7545/11	7545/42	7743/41	7742/34
	7842/22			
<i>R. indusiatus</i> FOCKE ?	7347/13	7445/23	7445/24	7446/13
	7545/13	7545/11	7646/11	
<i>R. laciniatus</i> WILLD.	7545/11			
<i>R. mollis</i> J. & C. PRESL	7646/11	7147/33		
<i>R. montanus</i> LIBERT	7244/41	7344/43	7447/12	7743/13
<i>R. nessensis</i> W. HALL	7146/41	7244/41	7344/43	7345/44
	7347/13	7347/31	7445/23	7445/24
	7446/13	7447/12	7545/13	7545/11
<i>R. oenensis</i> H.E. WEBER	7646/11	7742/34		
<i>R. cf. parthenocissifolius</i> HOLUB ined.	7244/41	7447/12		
<i>R. pedemontanus</i> PINKWART	7347/13	7742/34		
<i>R. cf. percrispus</i> HOLUB ined.	7345/44			
<i>R. plicatus</i> WEIHE & NEES	7347/13	7347/31	7447/12	
<i>R. radula</i> WEIHE	7446/13			
<i>R. Ser. Radula spec.</i>	7447/12			
<i>R. rudis</i> WEIHE	7146/41	7345/44	7347/31	7445/23
<i>R. salisburgensis</i> FOCKE	7742/41	7742/34		
<i>R. sulcatus</i> VEST	7244/41	7345/44	7347/31	7445/23
	7446/13	7447/12	7447/12	7545/11
<i>R. cf. verae</i> HOLUB ined.	7743/41			

Daten eingepflegen

Bemerkungen:

Die während der Exkursion aufgesuchten Gebiete waren bisher ein ziemlich "weißer Fleck" auf den Rubus-Landkarten in Bayern (vgl. Schönfelder/Bresinsky 1990: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns). Zwar nennt Sendtner in seiner 1860 (posthum) erschienenen Schrift "Die Vegetationsverhältnisse des Bayerischen Waldes" auch mehrere Brombeersippen für das aufgesuchte Gebiet, doch sind die Bestimmungen unsicher, da Sendtner offenbar seine Ergebnisse durch unkritischen Vergleich mit den Weiheschen Exsikkaten in Regensburg gewonnen hat (vgl. Flora 13, 1856). 1875 zählt Jos. Mayenberg die von Sendtner genannten Sippen für den Passauer Raum auf. Demnach wurden

R. suberectus (= R. nessensis), R. radula, R. fruticosus (= R. plicatus) und R. tomentosus (= R. canescens) festgestellt. Für das Inn-Isar-Hügelland gibt August Loher (1887) R. plicatus, R. sulcatus, R. thyrsoides (= R. grabowskii), R. bifrons, R. villicaulis (= R. gracilis), R. vestitus und R. koehleri an. Die Bestimmungen nahm Progel vor. In Zusammenarbeit mit dem Augsburger Lehrer J. B. Zinsmeister sammelte vor 70 Jahren der spätere Münchener Oberlandesgerichtsrat Lorenz Gerstlauer (1925) im Deggendorfer Raum Brombeeren. Von den 12 genannten Brombeersippen sind jedoch nur R. nessensis, R. plicatus und R. gracilis bestätigt.

Die Exkursion trug zur Auffindung neuer Fundorte für die erst jüngst geklärten Arten *Rubus indusiatus* und *Rubus amphistrophos* bei. Überrascht hat auch das bisher nicht bekannte Ausgreifen von *Rubus bertramii* durch das Inn-Isar-Hügelland bis nördlich der Donau. Die Bestätigung der noch unsicheren Funde der HOLUBschen Sippen *R. parthenocissifolius* ined., *R. percrispus* ined. und *R. verae* ined. bleibt vorerst abzuwarten, wäre aber ein nachträglich schöner Erfolg der Exkursion.

F. Fuvuvohr